Exercice 1 *Quelques résultats théoriques*

Démontrer que :

1. Toute suite convergente est bornée.
2. Toute suite croissante et non majorée diverge vers $+\infty$.
3. Si une suite converge, alors sa limite est unique.
4. La suite de terme général $(-1)^n$ n'a pas de limite.
5. Si (u_n) est bornée et (v_n) converge vers 0 alors $(u_n v_n)$ converge vers 0.
6. Toute suite convergente d'entiers relatifs est stationnaire et a pour limite un entier relatif.
7. Toute suite divergente vers $+\infty$ est minorée.

Exercice 2 *Comportement asymptotique des suites géométriques*

1. Démontrer l'inégalité de Bernoulli :

pour tout réel x positif et tout entier naturel n , on a : $(1+x)^n \geq 1+nx$

2. Soit (u_n) une suite définie par : $u_n = a^n$ avec $a \in \mathbb{R}$. Démontrer que :

- Si $a \in]1 ; +\infty[$ alors (u_n) est divergente (vers $+\infty$)
- Si $a = 1$ alors (u_n) est constante (donc convergente vers 1)
- Si $a \in]-1 ; 1[$ alors (u_n) est convergente vers 0
- Si $a \in]-\infty ; -1]$ alors (u_n) n'a pas de limite.

Exercice 3 *Étude d'une suite récurrente*

Soit f la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{2}}$

1. Étudier les variations de f .

2. Soit (u_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

- a. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $0 < u_n < u_{n+1} < 1$
- b. En déduire que la suite (u_n) converge.
- c. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$|u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2} |u_n - 1|$$

- d. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1|$$

En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 4 *Séries de Riemann*

On appelle "série" toute suite définie par une somme.

Les séries de Riemann sont les suites définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$$

Nous allons étudier le comportement de ces séries pour certaines valeurs entières de α .

0. Démontrer que la suite (u_n) est croissante. (Quelle que soit la valeur de $\alpha \in \mathbb{N}$)

1. Dans cette question, $\alpha = 1$. On a donc :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

(Cette série porte encore le nom d'"harmonique")

a. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{2n} \geq \frac{1}{2} + u_n$$

b. En déduire que (u_n) diverge.

2. Dans cette question, on suppose $\alpha = 2$. On a donc :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

a. Démontrer que, pour tout entier $k \geq 2$, on a :

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

b. En déduire que (u_n) est majorée par 2.

Pour $\alpha = 2$, la suite (u_n) est croissante et majorée, donc convergente.

3. Dans cette question, on suppose $\alpha \geq 3$.

Démontrer que (u_n) converge.

Exercice 5 *Suites de Héron*

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$$

1. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$f'(x) = \frac{(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})}{2x^2}$$

En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$.

2. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = E(\sqrt{a}) + 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

a) Démontrer, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sqrt{a} < u_{n+1} < u_n \leq u_0$$

En déduire que la suite (u_n) est convergente.

b) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - \sqrt{a} < \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{a})$$

c) En déduire, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < u_n - \sqrt{a} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{a})$$

d) En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 6 Étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2

Considérons la suite (u_n) , définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\begin{cases} u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \\ u_0 = 1 \\ u_1 = 2 \end{cases}$$

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = 2^n$$

Exercice 7 Moyenne arithmético-géométrique

Soient a et b deux réels tels que $a > b > 0$.

Soient (a_n) et (b_n) les suites définies par :

$$a_0 = a ; b_0 = b$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \text{ et } b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

Démontrer que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite.

Exercice 8 Divergence des suites $(\cos n)$ et $(\sin n)$

Démontrer que les suites $(\sin n)$ et $(\cos n)$ divergent.

Exercice 9 Étude d'une suite définie de façon implicite

Pour tout entier $n \geq 2$, on considère la fonction polynôme P_n , définie pour tout $x \in \mathbb{R}$, par :

$$P_n(x) = \sum_{k=1}^n x^k - 1$$

1. Étudier, pour tout $n \geq 2$, le sens de variation de P_n sur $\mathbb{R}_+$ et préciser $P_n(0)$ et $P_n(1)$.

En déduire que, pour $n \geq 2$, P_n admet une unique racine α_n dans $]0, 1[$. (On donnera la valeur exacte de α_2)

2. Démontrer que pour tout $n \geq 2$:

$$P_n(\alpha_{n+1}) < 0$$

En déduire le sens de variation de la suite (α_n) . La suite (α_n) converge-t-elle ?

3. a. Démontrer que pour tout $x \neq 1$, on a :

$$P_n(x) = \frac{x^{n+1} - 2x + 1}{x - 1}$$

En déduire que pour tout $n \geq 2$: $\alpha_n^{n+1} - 2\alpha_n + 1 = 0$

- b. Justifier, pour tout $n \geq 2$, les inégalités suivantes :

$$\alpha_n < \alpha_2 < 1$$

$$0 < 2\alpha_n - 1 < \alpha_2^{n+1}$$

- c. En déduire la valeur de la limite de la suite (α_n) .

Exercice 10 Étude d'une suite arithmético-géométrique. Passage à l'euro

1. Chaque année, la grand-mère de Julien a déposé de l'argent dans une tirelire afin de constituer une cagnotte pour son petit-fils.

Elle a commencé le 1^{er} janvier 1982 par un dépôt de 500 F. Depuis lors, elle a effectué un dépôt chaque 1^{er} janvier, en augmentant chaque année le montant de ce dépôt de 50 F.

On note :

- u_n le montant, exprimé en francs, de la somme déposée dans la tirelire le 1^{er} janvier de l'année 1982 + n . (Ainsi, $u_0 = 500$, $u_1 = 550$, ...)
- s_n le montant, en francs, de la somme contenue dans la tirelire après le dépôt de l'année 1982 + n . (Ainsi, $s_0 = 500$, $s_1 = 1050$, ...)

a) Calculer u_2 , puis exprimer u_n en fonction de n .

b) Calculer s_2 , puis exprimer s_n en fonction de n .

c) Le 1^{er} janvier 2002, la grand-mère de Julien effectue son dépôt habituel (en francs), puis offre la tirelire à Julien. Quel est le montant de la somme reçue par Julien ? Exprimer cette somme en francs, puis en euros. (Rappel : 1 euro correspond à 6,55957 francs)

2. Avec le cadeau de sa grand-mère, Julien décide d'ouvrir un compte bancaire et d'y placer la plus grande partie de la somme qu'il a reçue.

Le 1^{er} janvier 2002, il effectue un placement de 3000 euros, à intérêts composés, au taux annuel de 4%. (À la fin de chaque année, les intérêts seront incorporés au capital).

De plus, chaque 1^{er} janvier des années suivantes, il décide d'ajouter sur son compte la somme de 200 euros.

On note :

- c_n le montant, exprimé en euros, du capital disponible sur le compte bancaire de Julien après n années de placement. (Ainsi $c_0 = 3000$)
- (u_n) la suite définie par $u_n = c_n + 5000$. (Ainsi $u_0 = 8000$)

a) Justifier que, pour tout entier naturel n , on a : $c_{n+1} = 1,04 c_n + 200$.

b) Démontrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

c) Exprimer u_n en fonction de n , puis c_n en fonction de n .

d) Combien d'années, au minimum, Julien devra-t-il attendre pour disposer d'une somme de 6000 euros sur son compte bancaire ?

Exercice 1 *Quelques résultats théoriques*

1. Notons ℓ la limite de la suite (u_n) et I l'intervalle $]\ell - 1, \ell + 1[$. I est bien un intervalle ouvert centré en ℓ .

Comme (u_n) converge, à partir d'un certain rang N , tous les termes de la suite (u_n) sont dans I . Autrement dit :

$$n \geq N \Rightarrow \ell - 1 < u_n < \ell + 1$$

- Si $N = 0$, alors c'est fini, (u_n) est bornée par les réels $\ell - 1$ et $\ell + 1$.
- Si $N \geq 1$, alors notons A l'ensemble $\{u_0, \dots, u_{N-1}, \ell - 1, \ell + 1\}$, M le plus grand élément de A et m son plus petit élément. Ainsi (u_n) est bornée par les réels m et M .

2. Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$. Comme (u_n) n'est pas majorée, il existe un rang N pour lequel :

$$u_N > A$$

Mais comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N$, on aura :

$$u_n \geq u_N > A$$

Donc tous les termes de la suite sont dans l'intervalle $]A, +\infty[$ à partir du rang N .

Comme ceci est valable pour tout $A \in \mathbb{R}_+^*$, on en déduit bien que (u_n) diverge vers $+\infty$.

3. Raisonnons par l'absurde. Supposons que la suite (u_n) admette deux limites distinctes ℓ_1 et ℓ_2 avec $\ell_1 < \ell_2$.

Notons $d = \ell_2 - \ell_1$.

Comme (u_n) converge vers ℓ_1 , à partir d'un certain rang N_1 , tous les termes de la suite sont dans l'intervalle ouvert I_1 de centre ℓ_1 et de rayon $\frac{d}{3}$.

De même, comme (u_n) converge vers ℓ_2 , à partir d'un certain rang N_2 , tous les termes de la suite sont dans l'intervalle ouvert I_2 de centre ℓ_2 et de rayon $\frac{d}{3}$.

Donc à partir du rang $N = \max(N_1, N_2)$, tous les termes de la suite sont simultanément dans I_1 et I_2 . Or ces deux intervalles sont disjoints (ils ne se chevauchent pas). Ce qui n'est pas possible.

Ceci prouve l'unicité de la limite.

Illustration :

Comment, à partir du rang N_1 , tous les termes de la suite pourraient-ils se situer dans ces deux "tuyaux" ?

4. Supposons, au contraire, que la suite de terme général $(-1)^n$ converge vers un certain réel ℓ .

Soit $I = \left] \ell - \frac{1}{2} ; \ell + \frac{1}{2} \right[$. I est un intervalle ouvert centré en ℓ .

D'après notre hypothèse, il existe un rang N à partir duquel, on aura :

$$\begin{aligned} & (-1)^n \in I \\ \text{Autrement dit :} & \quad -\frac{1}{2} < (-1)^n - \ell < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{Or, pour } n \text{ pair, cela donne :} \quad \ell \in \left] \frac{1}{2} ; \frac{3}{2} \right[$$

$$\text{Et pour } n \text{ impair :} \quad \ell \in \left] -\frac{3}{2} ; -\frac{1}{2} \right[$$

D'où une contradiction. Donc la suite considérée diverge.

5. Exploitions nos deux hypothèses :

Comme (u_n) est bornée, il existe un réel M tel que pour tout n :

$$|u_n| \leq M$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Comme (v_n) est converge vers 0, on aura à partir d'un certain rang N :

$$v_n \in \left] \frac{\varepsilon}{M} ; \frac{\varepsilon}{M} \right[$$

$$\text{C'est-à-dire :} \quad |v_n| < \frac{\varepsilon}{M}$$

$$\text{D'où :} \quad |u_n| |v_n| < \frac{\varepsilon}{M} M \leq \varepsilon$$

$$\text{C'est-à-dire :} \quad |u_n v_n| \in \left] -\varepsilon ; \varepsilon \right[$$

Ce qui prouve bien que la suite $(u_n v_n)$ converge vers 0.

6. Soit (u_n) une suite d'entiers relatifs convergeant vers un certain réel ℓ .

Il existe donc un rang N tel que pour tout $n \geq N$, on ait :

$$|u_n - \ell| < \frac{1}{2}$$

$$\text{Autrement dit :} \quad u_n \in \left] \ell - \frac{1}{2} ; \ell + \frac{1}{2} \right[$$

Or, l'intervalle $\left] \ell - \frac{1}{2} ; \ell + \frac{1}{2} \right[$ qui est ouvert et de longueur 1 contient au plus un entier c et comme l'entier

u_n est aussi dans cet intervalle, on a : $u_n = c$

On a prouvé que la suite (u_n) est stationnaire (ou constante à partir d'un certain rang).

Par conséquent, la suite (u_n) converge vers c et par unicité de la limite $c = \ell$.

7. Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$. Comme (u_n) diverge vers $+\infty$, il existe un rang N tel que :

$$n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$$

- Si $N = 0$, alors, c'est fini, la suite (u_n) est minorée par A .
- Si $N \geq 1$ alors notons m le plus petit élément de l'ensemble $\{u_0 ; \dots ; u_{N-1} ; A\}$, ainsi, pour tout entier n :

$$u_n \geq A$$

Donc (u_n) est minorée.

Exercice 2 Comportement asymptotique des suites géométriques

1. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. On considère la propriété $\wp(n)$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\wp(n) : (1+x)^n \geq 1+nx$$

Remarque : on peut étendre cette inégalité à $x \in]-1, +\infty[$

- On a $\wp(0)$ puisque $(1+x)^0 \geq 1+0x$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$.
- Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\wp(n) \Rightarrow \wp(n+1)$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\wp(n)$: $(1+x)^n \geq 1+nx$

Comme $x > 0$, on a aussi $1+x > 0$. En multipliant l'inégalité ci-dessus par $(1+x)$, on obtient :

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x)$$

Or : $(1+nx)(1+x) = 1+x+nx+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2$

Comme $nx^2 \geq 0$, on a : $(1+nx)(1+x) \geq 1+(n+1)x$

D'où : $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

Ce qui est $\wp(n+1)$.

Bilan : on a $\wp(0)$ et pour tout n de $\mathbb{N}$: $\wp(n) \Rightarrow \wp(n+1)$

Donc, pour tout n de $\mathbb{N}$, on a : $\wp(n)$

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

2. Étude du comportement asymptotique des suites géométriques.

- Supposons $a \in]1; +\infty[$. Posons $x = a - 1$. Alors $x \in]0; +\infty[$.

D'après l'inégalité de Bernoulli :

$$a^n = (1+x)^n \geq 1+nx$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1+nx = +\infty$. Par comparaison, on en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$$

La suite (u_n) diverge donc vers $+\infty$.

- Si $a = 1$, le résultat est évident.
- Supposons maintenant $a \in]-1; 1[$.

Si $a = 0$, le résultat est évident.

Si $a \neq 0$, posons : $a' = \frac{1}{|a|}$

Ainsi : $a' \in]1; +\infty[$

D'après le résultat précédent : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a'^n = +\infty$

Par passage à l'inverse, nous obtenons : $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a|^n = 0$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$

La suite (u_n) converge donc vers 0.

- Supposons $a \in]-\infty ; -1]$.

Raisonnons par l'absurde : supposons que la suite (a^n) converge vers un certain entier ℓ .

Soit $I = \left] \frac{\ell}{2} ; \frac{3\ell}{2} \right[$. I est un intervalle ouvert centré en ℓ . D'après notre hypothèse, il existe un rang N à partir duquel, on aura :

$$\begin{aligned} & a^n \in I \\ \text{Autrement dit :} & \quad \frac{\ell}{2} < a^n < \frac{3\ell}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or, si } n \text{ est pair alors } a^n > 0, \text{ d'où :} & \quad 0 < \frac{3\ell}{2} \\ & \quad 0 < \ell \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Et si } n \text{ est impair alors } a^n < 0 \text{ d'où :} & \quad \frac{\ell}{2} < 0 \\ & \quad \ell < 0 \end{aligned}$$

D'où une contradiction. Donc la suite (a^n) diverge.

Exercice 3 Étude d'une suite récurrente

$$1. f = h \circ g \text{ où } g : x \in [-1, +\infty[\mapsto \frac{1+x}{2} \text{ et } h : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sqrt{x}.$$

Comme g est strictement croissante sur $[-1, +\infty[$ et h est strictement croissante sur $g([-1, +\infty[) = \mathbb{R}_+$, on en déduit, par composition, que f est croissante sur $[-1, +\infty[$.

- a. On considère la propriété $\wp$ définie, pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$0 < u_n < u_{n+1} < 1$$

- Comme $u_1 = \sqrt{\frac{1+u_0}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, on a bien :

$$0 < u_0 < u_1 < 1$$

D'où $\wp(0)$. La propriété $\wp$ est initialisée au rang 0.

- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\wp(n)$: $0 < u_n < u_{n+1} < 1$

Comme f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$ (puisque'elle l'est sur $[-1, +\infty[$), on a :

$$f(0) < f(u_n) < f(u_{n+1}) < f(1)$$

$$\text{C'est-à-dire :} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} < u_{n+1} < u_{n+2} < 1$$

$$\text{D'où :} \quad 0 < u_{n+1} < u_{n+2} < 1$$

Ce qui est $\wp(n+1)$.

La propriété $\wp$ est donc héréditaire à partir du rang 0.

Du principe de raisonnement par récurrence, on déduit : $\wp(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{C'est-à-dire :} \quad 0 < u_n < u_{n+1} < 1 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- b. On vient de voir que la suite (u_n) est croissante et majorée (par 1), donc elle converge.

- c. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{n+1} - 1 = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}} - 1 = \frac{\frac{1+u_n}{2} - 1}{\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + 1} = \frac{\frac{u_n - 1}{2}}{\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + 1} = \frac{1}{2} \frac{u_n - 1}{\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + 1}$$

Or $\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} \geq 0$, d'où $\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + 1 \geq 1$ et par passage à l'inverse : $\frac{1}{\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + 1} \leq 1$

D'où : $|u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2} |u_n - 1|$

d. Soit P la propriété définie, pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1|$$

On a $P(0)$.

Si $P(n)$ alors :

$$|u_{n+1} - 1| \stackrel{\text{2.c.}}{\leq} \frac{1}{2} |u_n - 1| \stackrel{P(n)}{\leq} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1|$$

D'où : $|u_{n+1} - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - 1|$

Ce qui est $P(n+1)$.

Du principe de raisonnement par récurrence, on déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $P(n)$, c'est-à-dire :

$$|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1|$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (limite d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2} \in]-1 ; 1[$), nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - 1| = 0$$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

Exercice 4 Séries de Riemann

0. On a, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^\alpha} > 0$

Donc la suite (u_n) est strictement croissante.

1. a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{2n} = u_n + \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq u_n + n \times \frac{1}{2n} \geq u_n + \frac{1}{2}$$

b. Montrons par récurrence la propriété $\wp$, définie sur $k \in \mathbb{N}$, par :

$$\wp(k) : \text{il existe un entier } n \text{ tel que } u_n \geq k$$

Comme $u_1 = 1$, on a $\wp(0)$ (et même $\wp(1)$).

Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $\wp(k)$. Il existe donc un entier n tel que :

$$u_n \geq k$$

Mais d'après la question précédente :

$$u_{4n} \geq u_{2n} + \frac{1}{2} \geq u_n + 1 \geq k + 1$$

Pour l'entier $m = 4n$, on a $u_m \geq k + 1$ d'où $\wp(k + 1)$.

Donc la propriété $\wp$ est vraie pour tout entier k .

La suite (u_n) n'est donc pas majorée. D'après l'exercice 1 (question 2), la suite étant croissante et non majorée, elle diverge.

2. a. Pour tout $k \geq 2$:

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

b. On a :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} \leq 2$$

Donc (u_n) est majorée par 2.

Pour $\alpha = 2$, la suite (u_n) est croissante et majorée, donc convergente.

3. Dans cette question, on suppose $\alpha \geq 3$.

Comme, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}$$

On aura aussi :

$$u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2$$

Donc (u_n) converge (puisque croissante et majorée).

Exercice 5 Suites de Héron

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$$

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - a}{2x^2} = \frac{(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a})}{2x^2}$$

Tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$:

x	$-\infty$	$-\sqrt{a}$	0	$\sqrt{a}$	$+\infty$				
signe de $x - \sqrt{a}$	-	-	-	0	+				
signe de $x + \sqrt{a}$	-	0	+	+	+				
signe de $2x^2$	+	+	0	+	+				
signe de la dérivée f'	+	0	-	-	0	+			
variations de f	$-\infty$	$\nearrow$	$-\sqrt{a}$	$\searrow$	$-\infty$	$\swarrow$	$\sqrt{a}$	$\nearrow$	$+\infty$

Remarque : cette fonction f est **impaire**.

Justification des signes :

$$x - \sqrt{a} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \sqrt{a}$$

$$x + \sqrt{a} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -$$

Un carré est positif ou nul

Ne pas oublier de compléter le tableau de variation avec les **valeurs des limites et des éventuels extrema**.

Les limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$

Les limites en $-\infty$ et 0^- s'en déduisent facilement en utilisant le fait que f est impaire.

2. a) Notons $\wp$ la propriété définie, pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\wp(n) : \sqrt{a} < u_{n+1} < u_n \leq u_0$$

Montrons que $\wp$ est initialisée au rang 0 :

Comme $u_0 = E(\sqrt{a}) + 1$, on a $\sqrt{a} < u_0$ et donc $a < u_0^2$.

D'où :
$$u_1 = \frac{1}{2} \left(u_0 + \frac{a}{u_0} \right) < \frac{1}{2} (u_0 + u_0) = u_0$$

Par ailleurs, f est strictement croissante sur $[\sqrt{a}; +\infty[$, donc comme $\sqrt{a} < u_0$, on a :

$$f(\sqrt{a}) < f(u_0)$$

$$\sqrt{a} < u_1$$

On a donc bien :

$$\sqrt{a} < u_1 < u_0$$

D'où $\wp(0)$.

Montrons que $\wp$ est héréditaire à partir du rang 0 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\wp(n) : \sqrt{a} < u_{n+1} < u_n \leq u_0$

Comme f est strictement croissante sur $[\sqrt{a}; u_0]$, nous avons :

$$f(\sqrt{a}) < f(u_{n+1}) < f(u_n) \leq f(u_0)$$

D'où :
$$\sqrt{a} < u_{n+2} < u_{n+1} \leq u_1 < u_0$$

Ce qui est $\wp(n+1)$.

Bilan : on a bien, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\sqrt{a} < u_{n+1} < u_n \leq u_0$

En conséquence, la suite (u_n) est **décroissante** et **minorée** (par $\sqrt{a}$) donc **convergente**.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right) - \sqrt{a} = \frac{1}{2} u_n + \frac{a}{2u_n} - \sqrt{a}$$

Or, d'après la question a), on sait que : $\sqrt{a} < u_n$

Par passage à l'inverse :
$$\frac{1}{u_n} < \frac{\sqrt{a}}{a}$$

D'où :
$$u_{n+1} - \sqrt{a} < \frac{1}{2} u_n + \frac{\sqrt{a}}{2} - \sqrt{a}$$

$$u_{n+1} - \sqrt{a} < \frac{1}{2} u_n - \frac{\sqrt{a}}{2}$$

$$u_{n+1} - \sqrt{a} < \frac{1}{2} (u_n - \sqrt{a})$$

c) Soit $\wp$ la propriété définie, pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\wp(n) : 0 < u_n - \sqrt{a} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{a})$$

• On a : $0 < u_0 - \sqrt{a} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 (u_0 - \sqrt{a})$ d'où $\wp(0)$.

• Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\wp(n)$. Alors :

$$0 < \overset{2.b)}{u_{n+1} - \sqrt{a}} < \overset{2.c)}{\frac{1}{2}} (u_n - \sqrt{a}) \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{a})$$

$$0 < u_{n+1} - \sqrt{a} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} (u_0 - \sqrt{a})$$

Ce qui est $\wp(n+1)$

Bilan : on a bien, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < u_n - \sqrt{a} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{a})$$

d) Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (puisque $\frac{1}{2} \in]-1 ; 1[$), nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{a}) = 0$$

Du théorème des gendarmes, on déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{a}$

Exercice 6 Étude d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2

On considère la propriété $\wp$, définie pour $n \in \mathbb{N}$, par :

$$\wp(n) : \text{pour tout entier } m \leq n, u_m = 2^m$$

- Comme $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$, on a $\wp(1)$.
- Montrons que, pour tout $n \geq 1$: $\wp(n) \Rightarrow \wp(n+1)$

Soit $n \geq 1$. Supposons $\wp(n)$: pour tout entier $m \leq n, u_m = 2^m$

$$\text{Alors : } u_{n+1} = 5 \times 2^n - 6 \times 2^{n-1} = 10 \times 2^{n-1} - 6 \times 2^{n-1} = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

D'où $\wp(n+1)$.

Bilan : on a $\wp(1)$ et (pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\wp(n) \Rightarrow \wp(n+1)$) donc on a : $\wp(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$ d'où :

$$\text{pour tout entier } m, u_m = 2^m$$

Exercice 7 Moyenne arithmético-géométrique

Il suffit de montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 = \frac{a_n^2 + 2a_n b_n + b_n^2}{4} - a_n b_n$$

$$\text{D'où : } (a_{n+1} - b_{n+1})(a_{n+1} + b_{n+1}) = \left(\frac{a_n - b_n}{2}\right)^2 \geq 0 \quad (1)$$

Et comme (a_n) et (b_n) sont positives (faire une récurrence), il vient, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$a_{n+1} \geq b_{n+1}$$

Enfin, comme $a_0 > b_0$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n \geq b_n$

Bien que ce résultat ne soit pas une hypothèse nécessaire du théorème des suites adjacentes, on l'utilise pour prouver les suivants :

- En effet, d'une part, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_{n+1} \leq \frac{a_n + b_n}{2} \leq \frac{a_n + a_n}{2} \leq a_n$

Donc la suite (a_n) est décroissante.

- D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $b_{n+1} - b_n = \sqrt{a_n b_n} - b_n = \sqrt{b_n} (\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}) \geq 0$

(par croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$ sur $\mathbb{R}_+$)

Donc la suite (b_n) est croissante.

- On considère maintenant la propriété $\wp$ définie pour $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\wp(n) : a_n - b_n \leq \frac{a-b}{2^n}$$

* On a bien sûr $\wp(0)$.

* Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\wp(n) \Rightarrow \wp(n+1)$:

Supposons $\wp(n)$:
$$a_n - b_n \leq \frac{a-b}{2^n}$$

Utilisons la propriété :
$$0 \leq X \leq Y \Rightarrow (Y-X)^2 \leq Y^2 - X^2$$

(Pour le démontrer, il suffit de multiplier l'inégalité $Y-X \leq Y+X$ par $Y-X \geq 0$)

Comme $0 \leq b_n \leq a_n$, on a :

$$(a_{n+1} - b_{n+1})^2 \leq a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 \stackrel{(1)}{\leq} \left(\frac{a_n - b_n}{2} \right)^2 \stackrel{\wp(n)}{\leq} \frac{(a-b)^2}{2^{2n+2}}$$

Et par croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$ sur $\mathbb{R}_+$: $|a_{n+1} - b_{n+1}| \leq \frac{|a-b|}{2^{n+1}}$

Et comme, $b_n \leq a_n$ pour tout n , on a $\wp(n+1)$.

Du principe de raisonnement par récurrence, on déduit :

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \wp(n) : a_n - b_n \leq \frac{a-b}{2^n}$$

D'où, par comparaison :
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = 0$$

On a donc prouvé que les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes.

Elles convergent donc vers une même limite (appelée moyenne arithmético-géométrique de a et b . On ne connaît pas d'expression de cette limite mais elle est liée aux intégrales elliptiques de 2^{ème} espèce...)

Exercice 8 Divergence des suites $(\cos n)$ et $(\sin n)$

Supposons que la suite $(\cos n)$ converge vers un certain réel $\ell \in [-1, 1]$.

On sait que :
$$\cos(n+1) = \cos n \cos 1 - \sin n \sin 1$$

Les suites $(\cos(n+1))$ et $(\cos n \cos 1)$ ont, par hypothèse, une limite.

On en déduit, par différence que la suite $(\sin n \sin 1)$ aussi.

Nous faisons un raisonnement par l'absurde.

Comme $\sin 1$ est non nul, la suite $(\sin n)$ converge vers un certain réel $k = \frac{\ell(\cos 1 - 1)}{\sin 1}$

Ce réel k est non nul car $\cos 1 \neq 1$.

En outre, on sait que : $\sin(2n) = 2 \cos n \sin n$

En passant à la limite, on aurait : $k = 2 \ell k$

Et comme $k \neq 0$: $\ell = \frac{1}{2}$

Par ailleurs, on sait que : $\cos(2n) = \cos^2 n - \sin^2 n$

En passant à la limite, on aurait : $\ell = \ell^2 - (1 - \ell^2)$

D'où : $2\ell^2 - \ell - 1 = 0$

$$\ell = 1 \text{ ou } \ell = -\frac{1}{2}$$

D'où une contradiction.

Donc les suites $(\cos n)$ et $(\sin n)$ divergent.

Exercice 9 Suite définie de façon implicite

1. La fonction P_n étant polynomiale, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$P'_n(x) = \sum_{k=1}^n kx^{k-1}$$

On a donc : $P'_n > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$

D'où : P_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

(La stricte monotonie sur $\mathbb{R}_+$ découle du fait que la dérivée ne s'annule qu'en un seul point sur $\mathbb{R}_+$)

De plus, P_n est continue sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $n \geq 2$, on a :

$$P_n(0)P_n(1) = -1 \times (n-1) < 0$$

On en déduit (théorème de bijection appliqué à P_n sur $]0, 1[$) que P_n admet une unique racine α_n dans $]0, 1[$.

Étude du cas $n = 2$: on a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$P_2(x) = x^2 + x - 1$$

Les racines de P_2 sont : $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} < 0$ et $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \in]0, 1[$

On a donc : $\alpha_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

2. On a, pour tout $n \geq 2$:

$$P_{n+1}(\alpha_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} \alpha_{n+1}^k - 1 = \sum_{k=1}^n \alpha_{n+1}^k + \alpha_{n+1}^{n+1} - 1 = P_n(\alpha_{n+1}) + \alpha_{n+1}^{n+1}$$

Or, $P_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0$ et $\alpha_{n+1}^{n+1} > 0$, d'où : $P_n(\alpha_{n+1}) < 0$

De plus, $P_n(\alpha_n) = 0$. L'inégalité ci-dessus s'écrit :

$$P_n(\alpha_{n+1}) < P_n(\alpha_n)$$

Comme P_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, il vient, pour tout $n \geq 2$:

$$\alpha_{n+1} < \alpha_n$$

Ce qui prouve que la suite (α_n) est décroissante.

Comme elle est de plus minorée par 0, elle converge.

3. a. Pour tout $x \neq 1$, on a d'après la formule de sommation de termes consécutifs d'une suite géométrique :

$$P_n(x) = \frac{x(x^n - 1)}{x - 1} - 1 = \frac{x^{n+1} - 2x + 1}{x - 1}$$

Comme, pour tout $n \geq 2$, on a $P_n(\alpha_n) = 0$, il vient :

$$\alpha_n^{n+1} - 2\alpha_n + 1 = 0$$

- b. La suite (α_n) étant strictement décroissante, on a évidemment pour tout $n \geq 2$:

$$\alpha_n < \alpha_2$$

(Ceux qui n'en sont pas convaincus peuvent le démontrer par récurrence)

Et comme $\alpha_2 \in]0, 1[$ (vu à la question 1), on a bien pour tout $n \geq 2$:

$$\alpha_n < \alpha_2 < 1$$

Par stricte croissance, sur $\mathbb{R}_+$, de l'application $t \mapsto t^{n+1}$, il vient :

$$\alpha_n^{n+1} < \alpha_2^{n+1}$$

Et d'après la question 3.a. :

$$2\alpha_n - 1 < \alpha_2^{n+1}$$

Or, $\alpha_n \in]0, 1[$ donc $2\alpha_n - 1 \in]0, 1[$ d'où :

$$0 < 2\alpha_n - 1 < \alpha_2^{n+1}$$

- c. Comme $\alpha_2 \in]0, 1[$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_2^{n+1} = 0$$

D'où, d'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (2\alpha_n - 1) = 0$$

Et finalement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \frac{1}{2}$$

Exercice 10 Étude d'une suite arithmético-géométrique. Passage à l'euro

- 1) a) $u_2 = u_1 + 50 = 600$

Chaque année le dépôt augmente de 50 F, donc :

$$u_{n+1} = u_n + 50$$

La suite (u_n) est donc arithmétique de raison $r = 50$.

De la relation $u_n = u_0 + nr$, on déduit :

$$u_n = 500 + 50n$$

- b) $s_2 = u_0 + u_1 + u_2 = 1650$

Le montant, en francs, de la somme contenue dans la tirelire le 1^{er} janvier 1982 + n est la somme de tous les dépôts effectués entre 1982 et 1982 + n :

$$s_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

C'est donc la somme des $n + 1$ premiers termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Une telle somme S se calcule avec la relation :

$$S = \frac{N(P + D)}{2} \quad \text{où} \quad \begin{cases} N = \text{nombre de termes de la somme} = n + 1 \\ P = \text{premier terme de la somme} = u_0 \\ D = \text{dernier terme de la somme} = u_n \end{cases}$$

On obtient :
$$s_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}$$

Et d'après la question [1a] :
$$s_n = \frac{(n+1)(500 + 500 + 50n)}{2}$$

D'où finalement :
$$s_n = (n+1)(500 + 25n)$$

c) On a : $2002 = 1982 + 20$. Donc $n = 20$. Il s'agit de calculer s_{20} .

D'après la question [1b] :
$$s_{20} = 21 \times (500 + 25 \times 20) = 21000$$

Le montant reçu par Julien est : 21000 francs

Soit en euros : 3201,43 euros

2) a) Le 31 décembre de chaque année, le capital c_n augmente de 4%. Il devient donc :

$$\left(1 + \frac{4}{100}\right) c_n = 1,04c_n$$

De plus, le jour suivant (1^{er} janvier), Julien ajoute 200 € sur son compte.

Le nouveau capital c_{n+1} est donc :
$$c_{n+1} = 1,04c_n + 200$$

b) Montrons qu'il existe un réel q tel que : $u_{n+1} = qu_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$u_{n+1} = c_{n+1} + 5000$$

D'après la question [2a] :
$$u_{n+1} = 1,04c_n + 200 + 5000 = 1,04c_n + 5200$$

$$u_{n+1} = 1,04(u_n - 5000) + 5200$$

$$u_{n+1} = 1,04u_n - 5200 + 5200$$

$$u_{n+1} = 1,04u_n$$

La suite (u_n) est donc géométrique de raison $q = 1,04$.

c) Comme la suite (u_n) est géométrique, on a d'après la relation $u_n = q^n u_0$:

$$u_n = 8000 \times 1,04^n$$

D'où :
$$c_n = 8000 \times 1,04^n - 5000$$

d) Il s'agit de déterminer le plus petit entier n tel que :

$$c_n \geq 6000$$

$$8000 \times 1,04^n - 5000 \geq 6000$$

$$8000 \times 1,04^n \geq 11000$$

En divisant par 8000 :
$$1,04^n \geq \frac{11}{8}$$

D'après la propriété : $A \geq B \Leftrightarrow \ln A \geq \ln B$ pour tous A et B de $]0 ; +\infty[$, on a :

$$\ln(1,04^n) \geq \ln\left(\frac{11}{8}\right)$$

D'après la relation : $\ln(A^n) = n \ln A$, pour tout A de $]0 ; +\infty[$ et tout n de $\mathbb{N}$, on a :

Si le logarithme népérien n'a pas encore été étudié, on peut déterminer n par tâtonnements.

$$n \ln(1,04) \geq \ln\left(\frac{11}{8}\right)$$

En divisant par $\ln(1,04)$ qui est **positif** (car $1,04 > 1$ et $\ln(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$) :

$$n \geq \frac{\ln\left(\frac{11}{8}\right)}{\ln(1,04)}$$

Or, d'après la calculatrice : $\frac{\ln\left(\frac{11}{8}\right)}{\ln(1,04)} \simeq 8,12$ à 10^{-2} près

On en déduit (n étant entier) : $n \geq 9$

Julien devra donc attendre au moins 9 ans avant de disposer de 6000 euros sur son compte.