

Une grande importance sera attachée à la clarté de la rédaction et au soin de la présentation

**EXERCICE1 (3pts):**

1) Le quotient de  $-430$  par  $17$  est :

a)  $-24$   ;      b)  $-25$   ;      c)  $-26$  .

2) Le chiffre des unités de l'entier  $9^{2011}$  est :

a)  $0$   ;      b)  $1$   ;      c)  $9$  .

3) Soit  $n$  un entier tel que :  $n \equiv 19[20]$  alors le reste modulo  $20$  de  $n^{100} + n^{181}$  est :

a)  $19$   ;      b)  $2$   ;      c)  $0$  .

4) Soit  $x$  un entier vérifiant :  $x^2 + 2x \equiv 3[7]$  alors :

a)  $x \equiv 2[7]$   ;      b)  $x \equiv 3[7]$   ;      c)  $x \equiv 1[7]$  ou  $x \equiv 4[7]$

**EXERCICE2 (3pts):**

Dans le plan orienté, on considère un rectangle direct ABCD tel que  $AB = 2AD$ . Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les points définis par :  $I = A * B$ ,  $J = D * C$  et  $K = S_{(DC)}(I)$ . On pose :  $f = S_{(IC)} \circ t_{\overline{AB}} \circ S_{(IJ)}$  et  $g = t_{\overline{IK}} \circ S_{(IC)}$ .

1) Caractériser l'application  $S_{(BC)} \circ S_{(IJ)}$  puis déduire que  $f$  est une rotation que l'on caractérisera.

2) Caractériser l'isométrie  $g \circ S_{(AJ)}$  puis déduire que  $g$  est une symétrie glissante dont on précisera l'axe et le vecteur.

3) Soit  $K' = S_C(B)$ . Déterminer  $g \circ f^{-1}(K)$  et  $g \circ f^{-1}(K')$  puis déduire la nature de  $g \circ f^{-1}$ .

**EXERCICE3 (3pts):**

On considère l'équation :  $(E) : z^3 + \alpha z^2 - \overline{\alpha} z - 1 = 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ .

1)a) Montrer que si  $z_0, z_1$  et  $z_2$  sont les solutions de (E) alors  $z_0 z_1 z_2 = 1$ .

b) Montrer que si  $z$  est une solution de (E) alors  $\frac{1}{z}$  est aussi solution de (E).

c) En déduire que (E) admet au moins une solution de module 1.

2) On suppose que  $\alpha = e^{i\theta}$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ .

Vérifier que  $-\alpha$  est une solution de (E) puis déterminer les autres solutions.

3) Utiliser ce qui précède pour résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $(E') : 2z^3 + (1 + i\sqrt{3})z^2 - (1 - i\sqrt{3})z - 2 = 0$ .

**EXERCICE4(5pts):**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]1; 2]$  par :  $f(x) = \frac{\sqrt{2x - x^2}}{x - 1}$ .

1)a) Etudier la dérivabilité de  $f$  à gauche en 2. Interpréter le résultat graphiquement.

b) Dresser le tableau de variations de  $f$  et construire sa courbe  $\zeta_f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

2) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet dans  $]1;2]$  une unique solution  $\alpha$  et que  $3/2 < \alpha < 2$ .

3)a) Montrer que  $f$  est une bijection de  $]1;2]$  sur un intervalle  $J$  que l'on précisera.

b) Construire la courbe  $\zeta_{f^{-1}}$  de  $f^{-1}$  dans le même repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

c) Montrer que pour tout  $x \in J$ ,  $f^{-1}(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ .

4) Soit  $U$  la suite définie sur  $\mathbb{N}$  par :  $U_0 = 1$  et  $U_{n+1} = f^{-1}(U_n)$ .

a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq U_n \leq 2$ .

b) Montrer que pour tout  $x \in [1;2]$ ,  $\left| (f^{-1})'(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

c) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} |U_n - \alpha|$  puis déduire que  $U$  converge et calculer sa limite.

### **EXERCICE5 (6pts):**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\left] -\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right[$  par :  $f(x) = -tg(\pi x)$ .

1) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\left] -\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right[$  sur  $\mathbb{R}$ .

2) Soit  $h$  la fonction réciproque de  $f$ . Montrer que  $h$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $h'(x) = \frac{-1}{\pi(1+x^2)}$ .

3) Soit  $\varphi$  la fonction définie sur  $[0;1[$  par :  $\varphi(x) = h\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ .

a) Montrer que  $\varphi$  est dérivable sur  $[0;1[$  et calculer  $\varphi'(x)$  pour tout  $x \in [0;1[$ .

b) En déduire que  $\forall x \in [0;1[$ ,  $\varphi(x) = h(x) - \frac{1}{4}$ .

4) Soit  $g$  la fonction définie sur  $[0;1[$  par :  $g(x) = \varphi(x) - (1+2x)h(x)$ .

a) Montrer que  $g$  est deux fois dérivable sur  $[0;1[$  et calculer  $g'(x)$  et  $g''(x)$ .

b) Etudier les variations de  $g'$  sur  $[0;1[$  puis déduire celle de  $g$ .

c) En déduire qu'il existe un unique réel  $c \in ]0;1[$  tel que  $c = tg\left(\frac{\pi}{8c}\right)$ .

5) Soient  $U$  et  $V$  les suites définies sur  $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$  par :  $U_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=n}^{2n} h\left(\frac{1}{k}\right)$  et  $V_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=n}^{2n} h\left(1 - \frac{2}{1-k}\right)$ .

a) Déterminer un encadrement de  $U_n$  puis calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

b) Montrer que  $V_n = U_n - \frac{1}{4}$  puis déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ .



**BON TRAVAIL**